

LITERATUR

Ausgabe: Dental Tribune German Edition 6/2019

Thema: Parodontalprophylaxe heute – millionenfach appliziert

Autor: Dexcel Pharma

Hinweis zur Verwendung des PerioChips

PerioChip® 2,5 mg Insert für Parodontaltaschen

Wirkstoffe: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zus.: 2,5 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat)

Sonstige Bestandteile: Hydrolysierte Gelatine (vernetzt mit Glutaraldehyd), Glycerol, Gereinigtes Wasser.

Anwendung: In Verbindung mit Zahnsteinentfernung und Wurzelbehandlung zur unterstützenden bakteriostat. Behandlung von mäßigen bis schweren chron. parodont. Erkr. m. Taschenbildg. bei Erwachsenen, Teil eines parodont. Behandlungsprogramms.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit geg. Chlorhexidinbis(D-gluconat) oder einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Bei ungefähr einem Drittel der Patienten treten während der ersten Tage nach Einlegen des Chips Nebenwirkungen auf, die normalerweise vorübergehender Natur sind. Diese können auch auf mechanisches Einlegen des Chips in Parodontaltasche oder auf vorhergehende Zahnsteinentfernung zurückzuführen sein. Am häufigsten treten Erkrankungen des Gastrointestinaltr. (Reakt. am Verabr.ort). auf. Gelegentlich.: Infektion der oberen Atemwege, Lymphadenopathie, Schwindel, Neuralgie, Zahnfleischhyperplasie, -schrumpfung., -juckreiz, Mundgeschwüre, Zahnempfindlichkeit, Unwohlsein, grippeähnliche Erkrankungen, Pyrexie. Nicht bekannt: Überempfindlichkeit (einschl. anaph. Schock), allergische Reaktionen wie Dermatitis, Pruritus, Erythem, Ekzem, Hautausschlag, Urticaria, Hautreiz. u. Blasenbildung. aus Berichten nach Zulassg.: system. Überempfindl. (einschl. anaph. Schock), Weichteilnekrose, Zellgewebsentzünd. u. Abszess am Verabr.ort, Geschmacksverlust, Zahnfleischverfärbg.

Weitere Hinweise: s. Fachinformation

Apothekenpflichtiger Stand: 08/2018.

Pharmazeutisches Unternehmen

Dexcel® Pharma GmbH

Carl-Zeiss-Straße 2

63755 Alzenau

Tel.: +49 (0) 6023 94800

Fax: +49 (0) 6023 948050