

Publikation: Zahnärztliche Assistenz 1/2021
Autor: Katja Mannteufel/ Kulzer GmbH
Thema: FAQ zur neuen PAR-Richtlinie

Literatur:

- 1 Repräsentative Umfrage unter Parodontitis-Betroffenen, Kantar GmbH, Januar 2020.
- 2 Das geschieht kontinuierlich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Tagen in ausreichend hoher Konzentration (MHK90).
- 3 Eickholz P. et al. Non-surgical periodontal therapy with adjunctive topical doxycycline: a double-blind randomized controlled multicenter study. J Clin Periodontol 2002; 108–117.
- 4 Die Ergebnisse bestätigen eine breit angelegte Anwendungsbeobachtung im niedergelassenen Bereich: Leyer et al.: Adjunctive Topical Application of 14 % Doxycycline-Gel: An Observational Study. J Dent Res (Spec Iss 92A): 2186, 2013.
- 5 Kim T. S. et al. Pharmacokinetic profile of a locally administered doxycycline gel on cervical fluid, blood and saliva. J Periodontol, 2002 Nov. 73 (11) 1285–91.
- 6 Preshaw PM et al. Subantimicrobial dose doxycycline as adjunctive treatment for periodontitis. A review. J Clin Periodontol. 2004 Sept;31 (9): 697–707.
- 7 Metzger Z et al. Low-dose doxycycline inhibits bone resorption associated with apical periodontitis. Int Endod J. 2008 Apr; 41 (4): 303–9.