Adaptation der neuen europäischen Leitlinie für die Parodontitistherapie

„Das Stufenkonzept der neuen EFP-Leitline ermöglicht es, einen Patienten strukturiert und **planmäßig auf dem höchsten derzeit verfügbaren Evidenzlevel** zu behandeln."

DG PARO-Leitlinienbeauftragter Prof. Moritz Kebschull

PerioChip®
– antibiotikafrei –

Einleitung Parodontitistherapie
Bei Diagnose Parorodontitis Stadium I - III

Grundlage der Therapie

Zahnärztliche Untersuchung, Analyse von lokalen und systemischen Risikofaktoren

Diagnose
(EFP/AAP 2018)

Stufe 1

Kontrolle von lokalen (Biofilm, Konkremente, Überhänge) und systemischen (u. a. Rauchen, Diabetes) **Risikofaktoren**

Professionelle mechanische Plaquereduktion (PMPR)

Reevaluation Stufe 1
- Bei Adhärenz und TST > 3mm – Stufe-2-Therapie
- Bei fehlender Mitarbeit – Wiederholung Stufe 1

Stufe 2

Maßnahmen der Stufe 1 **plus**

Subgingivale Instrumentierung, ggf. mit Adjuvantien (**CHX-Chips**[1] [Spülung in Sonderfällen] oder lokale/systemische AB)

Aber: Vorsicht mit Antibiotika

Keine Routinetherapie

Reevaluation Stufe 2
- Keine Resttaschen – Stufe 4/UPT
- Resttaschen > 4mm – Stufe 3

Stufe 3

Maßnahmen der Stufen 1 und 2 **plus** (an Resttaschen nach Stufe 2)

Parodontalchirurgie

- Access-Flap
- Resektiv
- Regenerativ
- Nur bei günstigen Patienten- und lokalen Faktoren!

Ggf. Wiederholung der Instrumentierung

Reevaluation Stufe 3
Endpunkt erreicht?
(TST ≤ 4 mm ohne BoP)
Stufe 4 (UPT)

Stufe 4

Unterstützende Parodontitistherapie

Risikoadaptierte Intervalle 3–12 Monate

Kontinuierliche Risikofaktor-Kontrolle (lokal/Mundhygiene & systemisch)

PMPR

Einmal Paro-Patient, immer Paro-Patient

Permanente Nachsorge notwendig!

Das Stufenschema der EFP-Leitlinie – erst nach dem erfolgreichen „Erklimmen" einer Stufe geht es zur nächsten.*

Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Moritz Kebschull, Birmingham

ADV-DE-096

* Sanz, M., D. Herrera, M. Kebschull, I. Chapple, S. Jepsen, T. Beglundh, A. Sculean and M. S. Tonetti (2020). „Treatment of stage I-III periodontitis-The EFP S3 level clinical practice guideline." J Clin Periodontol 47 Suppl 22: 4-60.

[1] PerioChip®