

Das GBT-Protokoll in der kieferorthopädischen Prophylaxe

Von EMS Electro Medical Systems GmbH

Literatur:

1 Tufekci E et al. Prevalence of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances. Angle Orthod, 2011;81(2):206-10

2 Boersma JG et al. Caries prevalence measured with QLF after treatment with fixed orthodontic appliances: influencing factors. Caries Res, 2005;39(1):41-7.

3 Bock NC, von Bremen J, Klaus K, Schulz-Weidner N, Ganss C, Ruf S. White spot lesions after fixed appliance treatment-Can we expect spontaneous long-term (≥ 15 years) improvement? Eur J Orthod. 2024;46(1):cjad070. doi: 10.1093/ejo/cjad070. PMID: 38128566.

4 Strafela-Bastendorf N, Bastendorf KD. Prophylaxe in der Kieferorthopädie - ein Praxiskonzept. Prophylaxe Impuls. 2022;3(26):118-127

5 Lussi A, Attin R. Wirkungsweise von Fluoriden: Allgemeine Aspekte – Festsitzende KfO-Apparaturen: Karies und Prophylaxe. Informationen aus Orthodontie & Kieferorthopädie. 2020; 52(03):211-218 DOI: 10.1055/a-1200-5821

6 Jordan AR et al. Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie. Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Kindern. Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ). Kurzfassung 2022