KN Kieferorthopädie Nachrichten 10_24

Ist das Frühbehandlungskonzept mykie® nachhaltig? Teil 1

Ein Beitrag von Dr. med. Andrea Freudenberg und Katrina Heuberger.

Literatur

[1] Moss, M. L. und Rankow, R. M. (1968). The role of the functional matrix in mandibular growth. Angle Orthod *38*, 95–103, doi:10.1043/0003-3219(1968)038<0095:TROTFM>2.0.CO;2.

[2] Grabowski, R. und Stahl, F. (2008). Die offene Mundhaltung im Kindesalter – Häufigkeit und Folgewirkungen. Informationen aus Orthodontie & Kieferorthopädie *40*, 101–109, doi:10.1055/s-2008-1004785

[3] DGKFO (o. J.). Archiv - Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie e.V., URL: https://www.dgkfo-vorstand.de/veroeffentlichungen/wissenschaftliche-stellungnahmen/archiv.html [Stand August 2024].

[4] Ihlow, D., Rudzki, I., Fanghänel, J., Kirschneck, C., Kubein-Meesenburg, D. und Proff, P. (2018). Kieferorthopädische Retention: Kriterien, Regeln und Maßnahmen der Rezidivprophylaxe: 260 Abbildungen, Hrsg. Janson, I., Georg Thieme Verlag, Stuttgart New York, doi:10.1055/b-004-129982.

[5] Proffit, W. R., Jr, H. W. F. und Sarver, D. M. (2006). Contemporary Orthodontics, Elsevier Health Sciences.

[6] Moss, M. L. und Salentijn, L. (1969). The primary role of functional matrices in facial growth. Am J Orthod *55*, 566–577, doi:10.1016/0002-9416(69)90034-7.

[7] Salbach, A., Grabowski, R. und Stahl de Castrillon, F. (2012). Der Einfluss orofazialer Dysfunktionen auf die Gebissentwicklung im Milch- und frühen Wechselgebiss. 1427–1437.

[8] Richmond, S., Shaw, W. C., Roberts, C. T. und Andrews, M. (1992). The PAR Index (Peer Assessment Rating): methods to determine outcome of orthodontic treatment in terms of improvement and standards. Eur J Orthod *14*, 180–187, doi:10.1093/ejo/14.3.180.

[9] Wissen – mykie® (o. J.). EOS Athen 2024, URL: https://mykie.de/kieferorthopaeden-logopaeden/kieferorthopaeden-logopaeden2/wissen [Stand August 2024].