

Literatur:

1. UltradentTM Data on file. Report 01780, 2020.
2. UltradentTM Data on file. Report WO#4422, 2018.
3. Fischer C et al. Clinical evaluation of pulp and dentine sensitivity after supragingival and subgingival scaling. Endod Dent Traumatol. 1991 Dec;7(6):259-65. doi: 10.1111/j.1600-9657.1991.tb00214.x.
4. Tammaro S et al. Root-dentin sensitivity following non-surgical periodontal treatment. J Clin Periodontol. 2000 Sep;27(9):690-7. doi: 10.1034/j.1600-051x.2000.027009690.x.
5. Nathoo S et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123–130.
6. Docimo R et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 17–22.
7. Gestützt durch eine Subanalyse von Docimo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 17-22. Nach 4 Wochen erreichten 40 von 40 Probanden (100 %, 10 von 10) eine dauerhafte Verbesserung der Empfindlichkeit sowohl bei taktilen Reizen als auch bei Luftstoßmessungen erfuhren.

* In-vitro-Studie, konfokales Bild nach einer Anwendung.