

| Messergebnisse | T1 | T2 | T3 | T2-T1 | T3-T2 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Winkel (°) | Median | Median | Median | Median | Median |
| Messstrecke (mm) | (Spannbreite) | (Spannbreite) | (Spannbreite) | (Spannbreite) | (Spannbreite) |
| SNA (°) | 75,2 (70,5–80,8) | 82,2 (70,6–86,0) | 82,3 (70,5–86,0) | 7,0 (0,1–11,0) | 0,1 (-0,1–1,5) |
| SNB (°) | 81,9 (74,4–85,8) | 78,8 (71,9–87,8) | 80,2 (73,5–84,0) | -3,2 (-4,0–2,1) | 1,4 (1,6–-3,9) |
| ANB (°) | -6,9 (-9–-3,5) | 3,0 (-2,5–6,0) | 2,5 (-4,8–4,0) | 9,9 (4,9–15,0) | 1,5 (-2,3–0,1) |
| NSL-NL (°) | 7,9 (4,3–13,0) | 8,8 (3,7–15,2) | 8,6 (4,1–13,1) | 0,9 (-1,0–2,2) | -0,2 (2,0–-2,1) |
| NSL-ML (°) | 28,6 (13,2–40,4) | 32,2 (15,4–43,3) | 30,1 (13,6–44,8) | 3,6 (2,2–8,0) | -2,1 (-3,0–-1,5) |
| SN-<u>A</u> (mm) | – | 9,0 (4,5–12,0) | 8,0 (3,0–12,0) | 9,0 (4,5–12,0) | -1,0 (-1,5–0) |
| Overjet (mm) | -7,5 (-10,0–-1,0) | 1,5 (1,0–2,5) | 1,0 (0,5–2,5) | 9,0 (11,0–3,5) | -0,5 (-0,5–0,0) |

SNA = Winkel zwischen der Sella-Nasion-Ebene und dem A-Punkt der Maxilla. Ermittlung der sagittalen Position der Maxilla

SNB = Winkel zwischen der Sella-Nasion-Ebene und dem B-Punkt der Mandibula. Ermittlung der sagittalen Position der Mandibula

ANB = Winkel zwischen dem A- und B-Punkt in Relation zum Nasion

NSL = Nasion-Sella-Ebene (anteriore Schädelbasis), Hauptreferenzebene

NL = Ebene durch den Gaumen, Nasenboden

ML = Unterkieferebene (durch Gnathion und den tiefsten Punkt des Kieferwinkels gemessen)

SN-A = Lot von der Sella-Nasion-Ebene in den A-Punkt der Maxilla

T1 = Zeitpunkt vor der Operation

T2 = Zeitpunkt sechs Monate nach Entfernung der Distraktoren

T3 = Zeitpunkt ein bzw. zwei Jahre nach Abschluss der Distraction