

Messergebnisse	T1	T2	T3	T2-T1	T3-T2
Winkel (°)	Median	Median	Median	Median	Median
Messstrecke (mm)	(Spannbreite)	(Spannbreite)	(Spannbreite)	(Spannbreite)	(Spannbreite)
SNA (°)	63,7 (60,0–68,0)	81,3 (75,0–88,0)	80,3 (74,0–85,0)	17,6 (15,0–20,0)	-1,0 (-1,0–3,0)
SNB (°)	78,7 (76,0–80,0)	76,3 (71,0–79,0)	76,0 (70,0–80,0)	-2,4 (-5,0–1,0)	-0,3 (-1,0–1,0)
ANB (°)	-13,0 (-14,0–12,0)	5,0 (2,0–9,0)	4,3 (2,0–4,0)	18,0 (16,0–21,0)	-0,7 (0,0–5,0)
NSL-NL (°)	12,0 (8,0–15,0)	15,7 (7,0–19,0)	12,0 (6,0–19,0)	3,7 (-1,0–4,0)	-3,7 (-1,0–0,0)
NSL-ML (°)	38,0 (34,0–45,0)	41,0 (31,0–50,0)	40,3 (31,0–50,0)	3,0 (-3,0–5,0)	-0,7 (0)
SN-⊥A (mm)	–	20,3 (15,0–25,0)	18,6 (12,8–21,8)	20,3 (15,0–25,0)	-1,7 (-2,2–3,2)
Overjet (mm)	-14,4 (-21,3–9,2)	3,2 (2,5–3,5)	1,8 (1,4–2,5)	17,6 (12,7–23,8)	-1,4 (-1,1–1,0)

- SNA** = Winkel zwischen der Sella-Nasion-Ebene und dem A-Punkt der Maxilla. Ermittlung der sagittalen Position der Maxilla
SNB = Winkel zwischen der Sella-Nasion-Ebene und dem B-Punkt der Mandibula. Ermittlung der sagittalen Position der Mandibula
ANB = Winkel zwischen dem A- und B-Punkt in Relation zum Nasion
NSL = Nasion-Sella-Ebene-(anteriore Schädelbasis), Hauptreferenzebene
NL = Ebene durch den Gaumen, Nasenboden
ML = Unterkieferebene (durch Gnathion und den tiefsten Punkt des Kieferwinkels gemessen)
SN-⊥A = Lot von der Sella-Nasion-Ebene in den A-Punkt der Maxilla
T1 = Zeitpunkt vor der Operation
T2 = Zeitpunkt sechs Monate nach Entfernung der Distraktoren
T3 = Zeitpunkt ein bzw. zwei Jahre nach Abschluss der Distraction